



Knowledge grows

YaraVita™ SAFE N™ 300

YaraVita™ SAFE N™ 300 е безопасен, концентриран, течен продукт, съдържащ азот формулиран специално за листно приложение, EO TOP

Съдържание на YaraVita™ SAFE N™ 300:

25.0% w/w = 31.2% w/v = 312 г/л общ азот (N)

3.9% w/w = 4.9% w/v = 49 г/л N амонячен азот (N)

3.9% w/w = 4.9% w/v = 49 г/л нитратен азот (N)

11.8% w/w = 14.7% w/v = 147 г/л урея (N)

Също съдържа:

5.4% w/w = 6.7% w/v = 67 г/л N (бавно действащ азот (N), като урея формалдехид, urea formaldehyde.

Съдържа намокрителни и прилепителни.

• YaraVita™ SAFE N™ 300 е течна формулация лесна за употреба, измерване и смесване в резервоара на пръскачката.

• YaraVita™ SAFE N™ 300 е смесим с повечето препарати за растителна защита и торове, което спестява време и пари.

Посетете : tankmix.com за повече информация.



Предимства на YaraVita™ SAFE N™ 300:

• YaraVita™ SAFE N™ 300 има изключително добри свойства за прилепване и намокряне на листата, осигурявайки максимална ефективност и безопасност на приложението му върху листата на растенията.

• Въпреки че YaraVita™ SAFE N™ 300 се усвоява изключително бързо от растенията, част от азота в него е в бавно действаща форма. Това осигурява по-продължително хранене с азот на растенията, което намалява броя на пръсканията.



ПРЕПОРЪКИ ПО КУЛТУРИ:



Зърнено-житни култури

От фаза 2- ри лист до края на братене - 500-1000 мл/дка (Zadok G.S. 12 до 25). Повторение при нужда след 10-14 дни. Също пръскане във фаза флагов лист (Zadok G.S. 39) - 500-1000 мл/дка. При нужда последвано от още 1-2 пръскания през период от 14 дни.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



Царевица

От фаза 4- 5 лист - 500-1000 мл/дка. Повторение при нужда след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



Рапица

Във фаза начало на удължаване на стъблото - 500 -1000 мл/дка, повторение при нужда след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане - 20 л/дка.



Слънчоглед

Доза - 500 - 1000 мл/дка във фаза бутон, при нужда повтаряне след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



Люцерна

След коситба - 500-1000 мл/дка. Повторение при нужда след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане 20 л/дка.



Грах, фасул, соя

Фаза начало на цъфтеж. Доза - 500 - 1000 мл/дка., повтаряне при формиране на шушулките.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



Броколи, брюкселско зеле, зеле, карфиол, китайско зеле, репи и други зелени култури

Във фаза начало на удължаване на стъблото (броколи, брюкселско зеле, карфиол)- 500-1000 мл/ дка и във фаза ранно развитие на главата (зелета), повторение при нужда след 7-10 дни.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.





Салати

Доза - 500 - 1000 мл/дка при полско производство, при оранжерийно производство - 200-300 мл/дка, във фаза 4-ти - 5-ти лист на салатите. При нужда повтаряне след 14 дена. Последно приложение 14 дена преди прибиране на реколтата.

Количество вода за пръскане – 50 л/дка.



Спанак полско производство

Фаза 4-ти - 5-ти лист за пръскане 500-1000 мл/дка. При нужда повторение след 14 дни.

Количество вода за пръскане – 50-100 л/дка.



Картофи

Доза 500 - 1000 мл/дка първо приложение преди стартирането на клубенообразуването, второ при начало на цъфтеж – 500 - 1000 мл/дка, трето след цъфтежа 500 - 1000 мл/дка л/дка.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



Оранжерийни култури

Максимална концентрация - 0.5 л на 100 л вода. Максимално количество вода 100 л/дка.

Фазите на приложение в зависимост от особеностите на културите.



Домати полско производство

Доза - 500 - 1000 мл/дка във фаза образуване на плодове, при нужда повтаряне след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане – 50-100 л/дка.



Пипер полско производство

От фаза образуване на завръзи - 500-1000 мл/дка. Повторение при нужда след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане – 50-100 л/дка.



Тиквички полско производство

Фаза начало на цъфтежа - 500-1000 мл/дка. При нужда повторение след 14 дни.

Количество вода за пръскане – 50-100 л/дка.





Knowledge grows



Пъпеша полско производство

Фаза начало на цъфтежа - 500-1000 мл/дка. При нужда повторение след 14 дни.

Количество вода за пръскане – 50-100 л/дка.



Дини полско производство

Фаза начало на цъфтежа - 500-1000 мл/дка. При нужда повторение след 14 дни.

Количество вода за пръскане – 50-100 л/дка.



Овощни култури

Доза - 500 - 1000 мл/дка предцъфтежно, при нужда повтаряне на ежемесечни интервали до късно лято.

Количество вода за пръскане – 50-100 л/дка.



Ягоди

Полско производство:

Фаза начало на цъфтеж. Доза - 500 - 1000 мл/дка., повтаряне през период от 14-21 дена.

Оранжерийно производство:

Максимална концентрация - 0.5 л на 100 л вода. Максимално количество вода 100 л/дка.

Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.



Малини

Фаза начало на цъфтеж. Доза - 500 - 1000 мл/дка., повтаряне през период от 14-21 дена.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.

Офиси:

София - тел: 02/ 954 60 02; 954 60 03;
факс: 02/ 954 60 04
Пловдив /с. Рогош/ - тел: 0888/ 839 322
Варна /с.Тополи/ - тел: 0519/ 22 80; 21 40
Русе; тел: 0884/ 855 634
Бяла /обл. Русе/ - тел: 0817/ 72 293
Монтана - 0882 898 007

Дистрибутор за:

Добрич: Агроферт ООД, 058/ 668 360;
0888 307 293; 0889 703 834
Силистра: тел: 0889/ 507 332
Карнобат: тел: 0889/ 728 412
www.kvsagro.com